

لا تتوقف عن تناول
الدواء الخاص بك في
حال ملاحظتك لعلامات
التحسن بعد بدء العلاج
أكمل علاجك!



إن كانت لديك شكايات مثل السعال المستمر
لأكثر من أسبوعين، وإفراز البلغم، والحمى،
والتعرق الليلي، وفقدان الوزن، وفقدان
الشهية، والتعب، راجع أقرب مؤسسة صحية!



تم تحضير هذا المنشور بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي. وزارة الصحة في الجمهورية التركية هي المسؤولة عن محتواه وقد لا يعكس وجهات نظر الاتحاد الأوروبي.

لمزيد من المعلومات و الدعم، راجعوا أقرب مركز صحي للمهاجرين.

خدمة جيدة من المكان الصحيح

f @ t v sihatproject

www.sihatproject.org

sihat



This project is funded by the European Union.
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
هذا المشروع تم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي


هدفنا هو تركيا
خالية من داء
السل



sihat



إن علاج داء السل في بلدنا مجاني!



إن داء السل مرض معدي.
داء السل مرض يمكن علاجه.
إن علاج داء السل لا يقل عن 6 أشهر. تطول هذه الفترة في مرض السل المقاوم للأدوية (18-24 شهراً).

تزول إمكانية نقل العدوى بعد 2-3 أسابيع من بدء العلاج لدى معظم المرضى.

من خلال استخدام الأدوية بشكل منتظم، يمكنك علاج داء السل تماماً وبالتالي منع انتقال العدوى لمن هم حولك.



العلاج الخاضع للمراقبة المباشرة (DGT)؛

هو تناول جميع جرعات أدوية السل تحت إشراف موظف أو مراقب مكلف خلال جميع مراحل العلاج.

العلاج الخاضع للمراقبة المباشرة ضروري من أجل علاج فعال وناجح.

لا تتوقف عن تناول الدواء الخاص بك في حال ملاحظتك لعلامات التحسن بعد بدء العلاج أكمل علاجك

إن الاستخدام غير المنتظم للأدوية يصعب علاجك، ويستمر نقل العدوى

يؤدي تناول غير المنتظم للدواء إلى حدوث السل المقاوم.

يؤدي تناول غير المنتظم للدواء إلى حدوث السل المقاوم. يتطلب مرض السل المقاوم تناول أدوية أكثر لفترة أطول.

راجع طبيبك في أقرب وقت ممكن في حال مواجهتك لتأثير غير متوقع أثناء تناول الأدوية الخاصة بك.

