

يوصى بإجراء اختبار
فيروس نقص المناعة
البشرية المكتسبة لدى
جميع الحوامل بمعرفتهن
وموافقتهن.

يفضل العلاج الطبي الذي
يبدأ مبكراً ويستمر مدى
الحياة؛
يمكن للأشخاص المصابين
بعدوى فيروس نقص المناعة
البشرية المكتسبة أن يعيشوا
نفس فترة حياة الأفراد
الأصحاء.



إن كنت تعتقد أنك معرضة
لخطر الإصابة بفيروس نقص
المناعة البشرية المكتسبة؛

قومي بمراجعة أقرب مؤسسة
صحية من أجل معرفة حالة الإصابة
بفيروس نقص المناعة البشرية
المكتسبة لديك،
احمي صحتك وصحة طفلك.

ينتقل الفيروس إلى الطفل
لدى واحدة من كل ثلاث
أمهات مصابات بفيروس
نقص المناعة البشرية
المكتسبة دون اتخاذ
التدابير وتلقي العلاج.

تم تحضير هذا المنشور بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي. وزارة الصحة في الجمهورية التركية هي المسؤولة عن محتواه وقد لا يعكس وجهات نظر الاتحاد الأوروبي.

لمزيد من المعلومات و الدعم ، راجعوا أقرب مركز صحي للمهاجرين.

خدمة جيدة من المكان الصحيح

f @ t v sihatproject


www.sihatproject.org

sihat



This project is funded by the European Union.
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
هذا المشروع تم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي

فيروس نقص
المناعة البشرية
المكتسبة / الإيدز



تعليمي
احمي
تلقى العلاج

sihat |

ما هي أعراض الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة؟

ما هو فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة؟

يُعرف فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة بأنه الـ HIV

يضعف هذا الفيروس جهاز المناعة ويسبب أمراضاً خطيرة (إنتانات، سرطانات، إلخ) والموت في حال ترك دون علاج.

ما معنى اختبار نقص المناعة البشرية المكتسبة HIV الإيجابي؟

هو الكشف عن إنتان فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة في دم الشخص.

تختلف الأعراض حسب مرحلة المرض.

قد يعاني بعض الأشخاص من أعراض شبيهة بأعراض الأنفلونزا (حمى، صداع، ألم البلعوم، آلام شديدة في العضلات والمفاصل، آلام في البطن، إسهال، طفح جلدي، تورم وألم في الغدد اللمفاوية، إلخ). بعد 2-4 أسابيع من الإصابة بالفيروس.

قد لا تظهر أية أعراض على بعض الأشخاص خلال هذه المرحلة.

بعد هذه المرحلة، التي يمكن أن تستمر لبضعة أسابيع، قد تظل العدوى صامتة لفترة طويلة (حوالي 5-10 سنوات) وقد تتطور إلى مرحلة الإيدز.



طرق العدوى

الاتصال الجنسي

(طريق انتقال العدوى الأكثر شيوعاً)

أي علاقة جنسية (فموية، مهبلية، شرجية) غير محمية (دون استخدام الواقي الذكري) مع شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة.

العدوى عن طريق الدم

الإجراءات التي تستخدم فيها الإبر والمحاقن وغيرها من الأدوات الحادة أو المواد الجراحية غير المعقمة الملوثة بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة (الوشم، الثقب، إلخ)

نقل الدم المصاب ومنتجاته

(يتم منذ عام 1987 في بلدنا؛ إعطاء كل دم ومنتج دم للمريض بعد إجراء الاختبارات اللازمة).

الانتقال من الأم إلى الجنين

من أم مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة؛ إلى الطفل خلال فترة الحمل أو أثناء الولادة أو بعدها (الرضاعة الطبيعية، إلخ)



ما هو الإيدز؟

متلازمة نقص المناعة البشرية المكتسبة والتي تحدث نتيجة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة والتي تظهر نتيجة للأذية التي تلحقها بجهاز المناعة في حال تركت دون علاج.

الإيدز هو أشد فترات العدوى التي يصاب فيها الشخص بالعدوى الانتهازية أو بعض أنواع السرطان أو غيرها من الأمراض الخطيرة.

التشخيص والعلاج المبكران يمنعان تطور الإيدز لدى حاملي فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة ويضمنان حياة صحية.

كيف ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة من الأم إلى الجنين؟

يمكن أن تنتقل العدوى إلى الجنين أثناء الحمل؛ عبر المشيمة

أثناء الولادة من خلال سوائل الأم ودمها في قناة الولادة

وبعد الولادة؛ تنتقل العدوى بالرضاعة الطبيعية

هل يمكن منع الانتقال من الأم إلى الجنين؟

من خلال التدابير والعلاجات التي يجب اتخاذها، يتم تقليل خطر انتقال العدوى إلى الجنين بشكل كبير (1% أو أقل) وتتم حماية صحة الجنين من ناحية الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة.

يجب الاستمرار بعلاج فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة، الذي بدأ قبل الحمل، أثناء الحمل، وإن تم اكتشاف فيروس نقص المناعة البشرية أثناء الحمل فإنه يجب البدء في العلاج.

على الرغم من أن العملية القيصرية المخطط لها موصى بها كطريقة للولادة، فإن القرار المشترك للأطباء المعنيين مهم.

يجب تطبيق العلاج الوقائي على الأم أثناء الولادة وعلى الطفل بعد الولادة، ويجب ضمان الرضاعة الطبيعية.

