

جرثومة الكزاز يمكن العثور عليها في  
التربة وروث الحيوانات والمسامر  
الملوثة

بالغبار و التراب والأظافر والأسلاك  
والمقصات وشفرات الحلاقة  
والأدوات الزراعية.

جرثومة الكزاز: تدخل من جرح/ من جزء  
مجروح من الجسم، مثل الحبل السري  
أو القدم أو اليد.

يتطور المرض عندما تدخل جرثومة الكزاز  
إلى الجسم وتستقر في الجهاز العصبي.  
الألم الشديد والتشنجات يمكن أن تكون  
مميّنة.

### كيف تتم الوقاية من مرض الكزاز؟

← يجب ارتداء الملابس مثل القفازات  
والأحذية لمنع الإصابة.

← عند إصابة الشخص أثناء العمل على  
التربة أو في أي وظيفة، أو إذا تم عضه من  
قبل حيوان، يجب غسل المنطقة المصابة  
جيدا بالماء والصابون مباشرة وتجب  
مراجعة أقرب مؤسسة صحية.



### كيفية الوقاية من الكزاز قبل وبعد الولادة؟

تتم الوقاية من مرض الكزاز عن طريق التطعيم ضد الكزاز في  
الوقت المناسب.

- ← يجب أن تتم الولادة في المستشفى.
- ← يتم إعطاء لقاح الكزاز لجميع الرضع والأطفال جنباً إلى جنب مع اللقاحات الأخرى.
- ← لمنع موت الأطفال حديثي الولادة (أول 28 يوماً) بسبب الكزاز، يجب أن تحصل النساء الحوامل على لقاح الكزاز.

النساء الحوامل: للحصول على اللقاح  
ضد الكزاز، يمكنهن التقدم بطلب  
إلى أطباء الأسرة الذين تم تسجيلهن  
لديهم، أو إلى المركز الصحي للمهاجرين  
أو إلى عيادة الأجناب داخل مركز الصحة  
المجتمعية.

يجب تلقيح النساء اللواتي تتراوح  
أعمارهن بين 15 و 49 عامًا ضد الكزاز  
ثلاث مرات على الأقل.

يجب تطبيق اللقاح الأول اعتباراً من الشهر الرابع من الحمل،  
يجب تطبيق اللقاح الثاني قبل شهر واحد من الولادة أو في موعد أقصاه شهر واحد،  
يجب تطبيق اللقاح الثالث بعد 6 أشهر من الولادة،  
يجب تطبيق اللقاح الرابع بعد سنة من اللقاح الثالث سواء كان هناك حمل أم لا،  
يجب تطبيق اللقاح الخامس بعد سنة من اللقاح الرابع سواء كان هناك حمل أم لا،  
يجب الاحتفاظ ببطاقة اللقاح، وإبرازها للعاملين الصحيين عند اللزوم.

الكزاز يمكن أن يكون مميتاً للأم و خاصة للطفل!



يتم إعطاء لقاح الكزاز علي شكل لقاح خماسي مختلط ( الخناق والسعال الديكي والكزاز وشلل الأطفال و والمستدمية النزلية B) في الأشهر 2 و 4 و 6 و 18.

في الشهر 48 ، يتم تطبيق جرعة معززة علي شكل لقاح مختلط رباعي (الخناق، السعال الديكي، الكزاز، شلل الأطفال).

في سن 13 (الشهر 156)، يستمر إعطاء الجرعات المعززة مع لقاح الخناق والكزاز (Td) للبالغين.



الطريقة الأكثر فعالية للوقاية من الكزاز هي التلقيح الكامل. التلقيح ضد الكزاز مجاناً في مراكز صحة المهاجرين.

تم تحضير هذا المنشور بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي. وزارة الصحة في الجمهورية التركية هي المسؤولة عن محتواه وقد لا يعكس وجهات نظر الاتحاد الأوروبي.

لمزيد من المعلومات و الدعم، راجعوا أقرب مركز صحي للمهاجرين.

خدمة جيدة من المكان الصحيح

f @ t v sihatproject

www.sihatproject.org

sihat



This project is funded by the European Union.  
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.  
هذا المشروع تم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي

الكزاز هو مرض يمكن الوقاية منه عبر اللقاح!

sihat

