

در صورت مشاهده علائم  
بهبودی پس از شروع  
درمان، نوشیدن داروی  
خود را متوقف نکنید.  
درمان خود را تکمیل  
کنید!



گر شکایاتی مانند سرفه بیش از دو هفته، تولید  
خلط، تب، تعریق شبانه، کاهش وزن، کاهش  
اشتها و ضعف دارید، به نزدیکترین موسسه  
بهداشتی مراجعه کنید!

این نشریه با حمایت مالی اتحادیه اروپا تهیه شده است. مسئولیت محتوای آن صرفاً بر عهده وزارت بهداشت جمهوری ترکیه است و منعکس کننده دیدگاه اتحادیه اروپا نمی‌باشد.

برای اطلاعات بیشتر و خدمات به نزدیکترین مرکز بهداشتی مهاجرین بیاید.

موقعیت مناسب، خدمات بهتر


f @ t v sihatproject

www.sihatproject.org

sihat



This project is funded by the European Union.  
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.  
هذا المشروع تم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي




هدف ما یک  
ترکیه بدون  
توبرکلوز  
است!

sihat



## درمان بیماری توبرکلوز (سل) در کشور ما رایگان است!



سل یک بیماری ساری است.  
سل یک بیماری قابل درمان  
است.

درمان سل حداقل 6 ماه  
است. این دوره در سل  
مقاوم به دارو (24-18 ماه)  
طولانی بوده میتواند.

در اکثر بیماران، 2-3 هفته  
پس از شروع درمان ساری  
بودن آن از بین می رود.

با استفاده داروها  
به شکل منظم می  
توانید سل را به  
طور کامل درمان  
کنید و در نتیجه  
از ابتلای اطرافیان  
تان به آن جلوگیری  
کنید.



## درمان با مشاهده مستقیم (DGT)؛

بیمار سل در تمام  
مدت درمان هر دوز  
از داروهای خود را با  
همراهی یک کارمند یا  
پرستار استفاده کند.

درمان با مشاهده  
مستقیم برای یک  
درمان مؤثر و موفق  
ضروری است.

هنگامی که پس از شروع درمان علائم  
بهبودی را مشاهده کردید، مصرف داروهای  
خود را قطع نکنید، درمان خود را کامل کنید.  
مصرف نامنظم دارو درمان شما را پیچیده  
می کند، ساری بودن آن ادامه خواهد  
داشت.

مصرف نامنظم دارو منجر به سل مقاوم می  
شود.

سل مقاوم به مصرف داروی بیشتر و طولانی  
مدت نیاز دارد.

اگر در حین مصرف داروهای خود با اثر  
غیرمنتظره مواجه شدید، در اسرع وقت با  
پزشک خود مشورت کنید.

