



شروع همه چیز سلامتی است، و شروع سلامتی واکسین است!

واکسین؛ از ناتوانی و مرگ ناشی از
دیفتری، سیاه سرفه، کزاز، فلج اطفال،
مننژیت، زردی و سیروز ناشی از
یرقان، سرطان کبد، سرخک، سرخجه،
اوریون، سل، ذات الریه، اسهال و غیره
محافظت میکند.

واکسیناسیون حق هر کودکی است

تمام واکسن های موجود در تقویم
واکسیناسیون ترکیه نیز به صورت
رایگان در اختیار کودکان که در
کشور ما مهمان هستند ارائه می شود.

این نشریه با حمایت مالی اتحادیه اروپا تهیه شده است. مسئولیت محتوای آن صرفاً بر عهده وزارت بهداشت جمهوری ترکیه است و منعکس کننده دیدگاه اتحادیه اروپا نمی باشد.

برای اطلاعات بیشتر و خدمات به نزدیکترین مرکز بهداشتی مهاجرین بیایید.

موقعیت مناسب، خدمات بهتر

f @twt y sihatproject

www.sihatproject.org

sihat



This project is funded by the European Union.
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
هذا المشروع تم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي

واکسین سلامتی است

sihat |



چه کسانی واکسینه می شوند؟

همه نوزادان باید به محض تولد طبق برنامه واکسین شوند. بزرگسالان سالم، افراد گروه های شغلی خاص و افراد مبتلا به بیماری های مزمن باید واکسین شوند.

چرا باید واکسن تزریق شود؟

در نتیجه شیوه های شورش، تعداد موارد بیماری های قابل پیشگیری با واکسن رو به کاهش است. در جوامعی که توسط افرادی تشکیل شده اند که با واکسینه شدن به این بیماری مقاوم شده اند، بیماری ها شایع نیستند و گسترش نمی یابند.

واکسین چیست؟

واکسن ها موادی هستند که با کاهش اثرات میکروب هایی که اثرات بیماری زا در انسان و حیوانات را ضعیف می کنند، ویا سموم (مواد زهری) ترشح شده توسط برخی میکروب ها ایجاد شده را ضعیف میکنند.

واکسین چگونه تاثیر میکند؟

در نتیجه واکسین اعمال شده، بدن میکروب ها یا سموم را می شناسد و یک روش دفاعی در برابر آنها ایجاد می کند. بنابراین بدن در برابر بیماری ها مقاوم میشود.

تقویم ملی واکسیناسیون دوران کودکی	هنگام تولد	1. پایان ماه	2. پایان ماه	4. پایان ماه	6. پایان ماه	12. پایان ماه	18. پایان ماه	24. پایان ماه	48. پایان ماه	13 سال
زردی سیاه	I	II			III					
توبرکلوز			I							
DaBT-IPA-Hib			I	II	III		R			
*KPA			I	II		R				
KKK						I			II	
DaBT-IPA									R	
OPA						I	II			
Td										R
هپاتیت A							I	II		
چیچک						I				

آیا واکسین عوارض جانبی دارد ؟

واکسن ها بی خطر هستند، عوارض جانبی خفیف و موقتی دارند. در کودکان واکسینه شده؛ ممکن است تب خفیف، بی قراری، بثورات خفیف، قرمزی، حساسیت و درد در محل تزریق وجود داشته باشد.

در این مورد ؛

- در ناحیه ای که واکسن تزریق شده ، جسم سرد می توان اعمال کرد.
- دارو های حاوی پاراستامول - داروهای ضد تب می توان استفاده کرد

DaBT-IPA: دیفتیری، سیاه سرفه بدون سلول، کزاز، فلج اطفال غیرفعال، واکسن هموفیلوس آنفلوانزا نوع B (واکسن ترکیبی پنج

KPA: واکسن پنوموکوک کونژوگه

KKK: واکسن سرخک، سرخجه، اوریون

DaBT-IPA: دیفتیری، سیاه سرفه بدون سلول، کزاز، واکسن فلج اطفال غیرفعال (واکسن ترکیبی چهارگانه)

OPA: واکسن خوراکی فلج اطفال

Td: دیفتیری بزرگسالان - واکسن کزاز

BCG: واکسن باسیلا کالمیتتی - گورین

R: راپل (تقویت)

* برای نوزادان متولد شده در تاریخ 01/01/2019، دو ، چهار و دوازده ماهگی اجرا خواهد شد.

** برای تمام کودکانی که وارد چهل و هشتمین ماهگی شده اند، از متولدین 1 ژوئیه 2016 شروع می شود. دوز دوم واکسین KKK و DaBT-IPA برای کودکان متولد شده قبل از 1 ژوئیه 2016 و هنوز تحصیلات ابتدایی را شروع نکرده اند، به عنوان واکسیناسیون مدارس در کلاس اول آموزش ابتدایی در سال های آموزشی 2020-2021، 2021-2022 و 2022-2023 انجام میشود.

برای سؤالات و تکالیف خود در مورد واکسین، به مؤسسه بهداشتی که در آن واکسن تزریق شده، میتوانید مراجعه کنید.