


This project is funded by the European Union.
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
هذا المشروع تم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي



زمان و فواصل پیگیری نوزاد

در ولادت؛	پیگیری 1
باید برای NTP خون گرفته شود، اولین دوز واکسن هپاتیت B تزریق شود و غربالگری شنوایی انجام شود.	
هفته اول (بین 1-10 روز)؛	پیگیری 2
موارد فوق را تعقیب کنید، کمبودی ها را کامل کنید، تا 1 سالگی روزانه 3 قطره ویتامین D مصرف کنید.	
روز 15 (بین 11-29 روز)؛	پیگیری 3
موارد فوق را تعقیب کنید، کمبودی ها را کامل کنید، تا 1 سالگی روزانه 3 قطره ویتامین D مصرف کنید.	
روز 41 (بین 30-59 روز)؛	پیگیری 4
دیسپلازی یا اختلال تکاملی مفصل ران را بررسی کنید (مخصوصاً اگر نوزاد دختر است، اگر سابقه خانوادگی دیسپلازی یا اختلال تکاملی مفصل ران وجود دارد، اگر سابقه ارائه بریچ وجود دارد).	
ماه دوم (بین 60-80 روز)؛	پیگیری 5
اگر نوزاد نارس یا کم وزن است، روزانه 4 قطره آهن را به طور پیشگیرانه شروع کنید.	
ماه سوم (بین 90-115 روز)؛	پیگیری 6
در مورد GKD، وضعیت شنوایی و بینایی، مصرف ویتامین D و وضعیت شیردهی را بررسی کنید و کمبودی ها را اصلاح کنید.	
ماه 4 (بین روز 120-150)؛	پیگیری 7
در صورت وجود کم خونی، دوز مناسب را شروع کنید، در غیر این صورت به طور پیشگیرانه 4 قطره آهن در روز (حداقل 4 ماه) شروع شود.	
ماه ششم (بین 180-210 روز)؛	پیگیری 8
وضعیت شنوایی و بینایی، مصرف ویتامین D و وضعیت شیردهی را بررسی و کمبودها را اصلاح کنید.	
ماه نهم (بین 250 تا 290 روز)؛	پیگیری 9
HGB را کنترل کنید و در صورت نیاز آهن را بررسی کنید. مصرف ویتامین D را ادامه دهید.	

برای اطلاعات بیشتر و خدمات به نزدیکترین مرکز بهداشتی مهاجرین بیابید.

موقعیت مناسب، خدمات بهتر