تاسو کولی شي ځان ته د 10 دقیقو وخت په ورکولو سره د رحم د سرطان څخه ځان وژغورئ.

د 30-65 کلونو عمر لرونکي میرمنې؛
د رحم د سرطان د معاینه کولو لپاره، کولی شي د کورنۍ روغتیایي مرکزونو، د کډوالۍ روغتیایي مرکزونو، د مهاجرینو د روغتیایي مرکزونو، د سرطان چټک تشخیص د زده کړې مرکزونو او ګرځنده سرطان سکرینینګ وسیلو په کارولو سره د تشخیص خدمتونه ترلاسه کړي.



د رحم شرطان؛ داسي یوه ناروغي ده چې د (هچ پي وي) او (پي ای پي) سمیر ټیستونو په واسطه چټک تشخیص، مخنیوي او درملنه کیدی شي.

دا خپرونه د اروپايي ټولنې په مالي مرسته جوړه شوې ده. د دې محتويات يوازې او يوازې د ترکيې د جمهوريت د روغتيا وزارت مسؤليت دی او د اروپايي اتحاديې نظرونه نه منعکس کوي.

مناسب ځای، ښه خدمت

د نورو معلوماتو او ملاتړ لپاره خپل نږدې د مهاجرو روغتیایی مرکز ته ورشئ.

sihhatproject

www.sihhatproject.org

sıhhat

This project is funded by the European Union.
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
هذا المشروع تم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي

د رحم په سرطان کې ژر تشخیص ژوند ژغوري.

sıhhat

- که تاسو سګرټ څکوي.
- که تاسو د دوري او یا جنسي اړیکې وروسته د داغونو په بڼه وینه لري.
- که تاسو دوامداره، بد بوی لرونکی جریانات لري
- که تاسو د مینوپازول څخه وروسته دوره کې وینه بهیدنه لري.
- حتي که تاسو هیڅ شکایت نه لري، یوازې د دې لپاره چې تاسو ښځه یاست...

تاسو باید د (هچ پي وي) ازموینه وکړي!

د (هچ پي وي) ازموینه په هر ۵ کلونو کې ترسره کیږي د رحم د سرطان مخنیوي لپاره غوره میتود دی.

د (هچ پي وي) ازموینه یو بې درده او ساده پروسیج. دی چې د نسایی معایناتو په جریان کې د رحم څخه نمونې په اخستلو سره ترسره کیږي.

په یاد ولرئ!

کله چې د (هچ پي وي) ازموینې لپاره راځئ

نو باید د حیض په دوران غې نه وي.

تناسلی اله (مهبل) لږ تر لږه د ازموینې څخه دوه ورځ مخکې نه وي منځل شوی، هیڅ ماده لکه درمل، کریم یا جیل باید نه وي کارول شوي.

تاسو باید د ازموینې څخه دوه ورځې د مخه جنسي اړیکه ونلري.