



که امیندواره بنځه تر
څلوېښتو هفتو پورې ولادت
ونه کړی، باید ژرترژره په
روغتیایي مؤسسه کې د
نسایي او نسایي متخصصینو
ته د زیږون ترسره کولو په
موخه خبر ورکړل شي.



د زیږون مور ته د سپارښتنه کیري چې د
امیندواری په جریان کې 8 څله روغتیایي
معایناتو ته لاره شي ترڅو سالم
امیندواری ولري، د خپل ځان او ماشوم
روغتیا ساتنه وکړي او په لومړي مرحله
کې خطرناک حالتونه تشخیص کړي.

دا څېړنه د اروپايي ټولني په مالي مرسته جوړه شوې ده.
د دې محتويات يوازې او يوازې د ترکيې د جمهوريت د
روغتيا وزارت مسؤليت دی او د اروپايي اتحاديې نظرونه
نه منعکس کوي.

د نورو معلوماتو او ملاتړ لپاره خپل نږدې د مهاجرو روغتیایي مرکز ته ورشئ.

مناسب ځای، ښه خدمت

f @ t v sihatproject

www.sihatproject.org

sihat



This project is funded by the European Union.
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
هذا المشروع تم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي

د سالم زیږون
لپاره لږترلږه 4
څله تعقیب



sihat



لومړی تعقیب

دا باید د امیندواری په لومړی 14 اونيو کې ترسره شي. د 14 مې اونۍ وروسته د امیندواری په تشخیص کې، د امیندواری اونۍ په پام کې نیولو پرته ترسره شوی تعقیب د «لومړی تعقیب» په توګه ګڼل کیږي.

د حیض وروستی نیتې
قد، وزن، د وینې فشار
او د ماشوم د زړه غږ
اندازه کیږي.

د 12. اونۍ څخه د
ویټامین ډي او د 16. اونۍ
څخه د اوسپنې کارولو
توصیه کیږي.

د وینې معاینه ترسره کیږي، د
امیندواریه میرمنې او د هغې د
ملګري د وینې ګروپ معاینه
کیږي، د تش نس د وینې شکر
معاینه کیږي او د ادرار تحلیل
ترسره کیږي.

ډوهم تعقیب

24-18 مې اونۍ

د حیض وروستی نیتې
قد، وزن، د وینې فشار
او د ماشوم د زړه غږ
اندازه کیږي.

د وینې معاینه ترسره کیږي، د امیندواریه
میرمنې او د هغې د خاوند د وینې ګروپونه
معاینه کیږي، د تش نس د وینې شکر معاینه
کیږي او د ادرار تحلیل ترسره کیږي (که په
لومړی تعقیب کې نه وي ترسره شوي).

د 12. اونۍ څخه د
ویټامین ډي او د 16. اونۍ
څخه د اوسپنې کارولو
توصیه کیږي.

د 24-28 مې اونيو ترمنځ د خولي لا لاري د
ګلوکوز د اندازي د ازموینې هدایت ورکول
کیږي.

د تیتانوس واکسین پښتل کیږي او د اړتیا په
صورت کې تزریق کیږي.

دریم تعقیب

32-28 مې اونۍ

د حیض وروستی نیتې
قد، وزن، د وینې فشار
او د ماشوم د زړه غږ
اندازه کیږي.

د وینې معاینه ترسره کیږي، د
امیندواریه میرمنې او د هغې د
خاوند د وینې ګروپونه معاینه
کیږي، د تش نس د وینې شکر
معاینه کیږي او د ادرار تحلیل
ترسره کیږي (که له دې مخکې نه
وي ترسره شوي).

د 12. اونۍ څخه د
ویټامین ډي او د 16.
اونۍ څخه د اوسپنې
کارولو توصیه کیږي.

د تیتانوس واکسین پښتل کیږي او
د اړتیا په صورت کې تزریق کیږي.

څلورم تعقیب

36-38 مې اونۍ

د حیض وروستی نیتې
قد، وزن، د وینې فشار
او د ماشوم د زړه غږ
اندازه کیږي.

د وینې معاینه ترسره کیږي، د
امیندواریه میرمنې او د هغې د خاوند
د وینې ګروپونه معاینه کیږي، د تش
نس د وینې شکر معاینه کیږي او د
ادرار تحلیل ترسره کیږي (که له دې
مخکې نه وي ترسره شوي).

د ویټامین ډي او
اوسپنې کارول
سپارښتنه کیږي.

د تیتانوس واکسین پښتل کیږي او د
اړتیا په صورت کې تزریق کیږي.

