

لوړ فشار (هايپرټنشن)،

لوړ فشار هغه وخت را منځته كيږي كله چې د وينې جريان لپاره زموږ په رگونو كې د وينې فشار د نارمل كچې څخه لوړ وي.

د وينې لوړ فشار ترټولو عام نښې

سرخوږی (سرگرځيدل)

د سر درد

د زړه درد او ضربان

د غوږ زنگا

د ساه لنډۍ

دوه گونى او تياره ليد

د پوزې وينې

د زړه غير منظم ضربان



څنگه كولى شو د وينې فشار سره مقابله وكړو؟

راځئ چې د مالگي مصرف كم كړو

راځئ چې وزن كنټرول كړو

راځئ چې د سبزيجاتو او ميوو مصرف زيات كړو

راځئ حركت وكړو

راځئ چې په منظم ډول د وينې فشار اندازه كړو.

دا خپرونه د اروپايي ټولنې په مالي مرسته جوړه شوې ده. د دې محتوايات يوازې او يوازې د تركيې د جمهوريت د روغتيا وزارت مسؤليت دى او د اروپايي اتحاديې نظرونه نه منعكس كوي.

د نورو معلوماتو او ملاتړ لپاره خپل نږدې د مهاجرو روغتيايي مركز ته ورشئ.

مناسب ځاى، ښه خدمت

f @ t v sihatproject

www.sihatproject.org

sihat



This project is funded by the European Union.
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
هذا المشروع تم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي

لوړ فشار په هر عمر
كې ليدل كيدى شي!


sihat



ولې د وينې لوړ فشار خطرناک ده؟

د وينې د لوړ فشار لاملونه

که د وينې لوړ فشار کنترول نه شي، دا د زړه د حملې، د زړه ناروغۍ، په رگونو کې د انيوريزم جوړېدلو، د پښتورگو ناکامۍ، ږوندوالی او مغزي نارغويو لامل کېدای شي د. چاغوالی، د کوليسترول او د شکر ناروغۍ سره، د سټروک او د زړه د حملې خطر ډیرېږي.



په ډیری ناروغانو کې د علت پېژندل ستونزمن دي. ډیر مختلف عوامل کولی شي د وينې د فشار لامل شي. خو ګڼ شمیر عوامل دا دي؛

کورنۍ (جنیټیکي)، جنس، د شکر ناروغي، چاغوالي، د سګرټ څکول، الکول، سټرس، د مالګې زیات استعمال، ناکافي فزیکي فعالیت، د غیر صحی خوړو عادت او عمر زیاتوالی.

د وينې لوړ فشار ځیني وختونه د ناروغۍ له امله هم رامنځته کېدی شي: د پښتورگو ناروغۍ، هورموني اختلالات، د وينې رگونو جوړښتي اختلالات. د وينې لوړ فشار د امیندواری پر مهال لیدل کېدی شي.

مخنیوی او درملنه

د تمباکو او الکول استعمال پرېښودل، صحی خواړه خوړل،

صحی خواړه خوړل

منظم تمرین

د مالګې مصرف کمول

د اضافي وزن له لاسه ورکول

د ممکن د لوړ فشار د کنترول لپاره کافي وي.

که دا اقدامات کافي نه وي، د یو ډاکټر تر څارنې لاندې ناروغ ته د درمل ورکول پیل کېدی شي.



ماشومان هم کېدای شي د وينې لوړ فشار سره مخ شي

روغتیايي ادارې ته د مراجعه په صورت کې ټول هغه ماشومان چې عمر ونه یې له دريو او تر هغه پورته وي باید د وينې فشار اندازه شي. د خطر د ناروغانو ګروپ د وينې فشار باید د زیږون څخه ورسته سمدلاسه اندازه شي.

په ماشومانو کې د وينې فشار؛ د عمر، جنس او قد له مخې توپیر لري له دي لامله د بالغ په څیر کوم نارمله محدوده اندازه شتون نلري.

یو ماشوم کولی شي په هر عمر کې د وينې لوړ فشار ولري. چاغوالي د ماشومتوب د لوړ فشار لپاره یو لوی خطر فکتور دی.



د درې کلنې څخه، د خپل ماشوم د وينې فشار په ټولو معایناتو کې اندازه کړئ.