

روغتیا د هر څه سر دی، واکسین د روغتیا سر دی!

واکسین; ډیپتیریا، پرتوسیس،
تیتانوس، پولیو، مننژیت، یرقان او
سپروسیس، د ځیگر سرطان، شری،
روبیلا، ممپس، نری رنځ، سینه بغل،
اسهال، او داسې نور، چې د مرگ
سبب کیدای ش ی ژغوري.

واکسین کول د هر ماشوم حق دی

د ترکیبې د واکسین په کلوزه کې شامل
ټول واکسینونه زموږ ماشومانو ته چې
زموږ په هیواد کې میلمانه دي وړیا
ورکول کیږي.

دا خپرونه د اروپایي ټولنې په مالي مرسته جوړه شوې ده. د دې محتویات یوازې او یوازې د ترکیبې د جمهوریت د روغتیا وزارت مسؤلیت دی او د اروپایي اتحادیې نظرونه نه منعکس کوي.

د نورو معلوماتو او ملاتړ لپاره خپل نږدې د مهاجرو روغتیايي مرکز ته ورشئ.

مناسب ځای، ښه خدمت

f @ t v sihatproject

www.sihatproject.org

sihat



This project is funded by the European Union.
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
هذا المشروع تم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي

واکسین روغتیا ده

sihat |



څوک واکسین کيږي؟

ټول ماشومان باید د زیږون ورسته د مهال ویش سره سم واکسین شي. صحتمند لویان، ځانگړو مسلکی کارکونکی او هغه خلک چې اوږدمهاله ناروغۍ لري هم باید واکسین شي.

ولې واکسین باید تطبیق شي؟

د واکسین د تطبیق په پایله کې د واکسین د مخنیوي وړ ناروغیو د قضیو شمیر په کمیدو کې مرسته کوي. په هغو ټولنو کې چې د واکسین کولو په واسطه د ناروغۍ په وړاندې مقاومت رامنځ ته شوي، هلته ناروغۍ نه عام دي او نه هم خپرېږي.

واکسین څه دي؟

واکسین هغه مواد دي چې د میکروبونو د ضعیف کولو او یا پټ شوي زهرونو (زررو) له لارې رامینځته لاس ته راځي او په انسانانو او حیواناتو کې د ناروغیو اغیزو د کمولو لپاره کارېږي.

واکسین څنگه کار کوي؟

د تطبیق شوي واکسین په نتیجه کې بدن میکروبونه یا زهرجن پیژني او د دوی پر وړاندې دفاعي حجرات رامینځته کوي. په دې توگه، بدن د ناروغیو په وړاندې معافیت ترلاسه کوي.

د ماشومتوب لپاره د واکسین ملی مهالویش	په زیږون کې	د 1 میاشتې پای	د 2 میاشتې پای	د 4 میاشتې پای	د 6 میاشتې پای	د 12 میاشتې پای	د 18 میاشتې پای	د 24 میاشتې پای	د 48 میاشتې پای	د 13 کلنۍ په عمر کې
Hep-B	I	II			III					
BCG			I							
DaBT-IPA-Hib			I	II	III		R			
*KPA			I	II		R				
KKK						I			II	
DaBT-IPA									R	
OPA					I		II			
Td										R
هپاتیت اې							I	II		
شری						I				

ایا واکسینونه جانبي عوارض لري؟

واکسین خوندي دي، د دوی جانبي عوارض لږ او لنډمهاله دي. په واکسین شوي ماشومانو کې؛ د انجیکشن په ځای کې ممکن معتدل تبه، بې خوښۍ، یو څه ټوخی، سوروالی، نرموالی او درد شتون ولري په دې صورت کې؛

- د واکسین پلي شوی ځای کې یخۍ کینډولاي شي.
- د درد وژونکي او اټیپایرېټیکونه لکه پاراسیټامول ورکړل شي

DaBT-IPA: ډیپټیریا، سیلولر پرتوسس، ټیتانوس، غیر فعال پولیو، د هیموفیلس انفلویینزا ډول بی واکسین (پنځه مخلوط واکسین).

KPA: د نیوموکوکل ضد واکسین

KKK: د شری، روییلا، ممپس واکسین

DaBT-IPA: ډیپټیریا، سیلولر پرتوسس، ټیتانوس، د پولیو غیر فعال واکسین (کواد مخلوط واکسین).

OPA: د پولیو واکسین

Td: د بالغ ډول ډیفټیریا - ټیتانوس واکسین

BCG: باسیلوس کالمته-گورین واکسین

R: پیاوړې کولونکی

*له 2019.01.01 نېټې وروسته زینبول شوي ماشومانو ته 2م او 4م او 12 می میاشتو کې تزریق کيږي.

**1 جولای 2016 نېټې وروسته زینبول شوي ماشومان څخه په پیل سره او 48 می میاشتې ته داخل شوي ټولو ماشومانو ته تزریق کيږي. 1 جولای 2016 د مخه زېږېدلي ماشومان او فعلا په ابتدایي ښوونځي د نه داخلشو په شرط د شری، روییلا، ممپس واکسین دوهم ډوز تزریق او ډیټانوس واکسین د 2020-2021، 2021-2022، او 2022-2023 تعلیمي کال کې د ابتدایي ښوونځیو په لمړي ټولګي کې د ښوونځیو د واکسین کولو په ښکل تزریق کيږي.

د واکسینونو په اړه ستاسو د پوښتنو او ستونزو لپاره، د روغتیا ادارې ته مراجعه وکړئ چیرې چې واکسین ورکول کيږي