

ډیری ناروغۍ چې د میرمنو او ماشومانو روغتیا تهدیدوي او د مړینې سبب ګرځي د زیږون نا مناسب وخت، نا مناسب شمیر، نا مناسب وقفو، غیر خوندي سقط او ډیر زیږون له امله رامنځ ته کیږي.

په نړۍ غې له هرو لسو میندو څخه یوه یې په غیر صحي شرایطو کې د سقط له امله مري.



د امیندواری د مخنیوي میتودونو اصلي موخه د میندو او ماشومانو د روغتیا ساتنه او د سقط مخنیوی ده.

د هرې کورنۍ لپاره مناسب میتودونه توپیر لري.

د مناسبه طریقی د معلومولو باید له ډاکټر/قابلي یا نرس سره مشوره وشي.

دا څېړونه د اروپایي ټولني په مالي مرسته جوړه شوې ده. د دې محتويات یوازې او یوازې د ترکیې د جمهوریت د روغتیا وزارت مسؤلیت دی او د اروپایي اتحادیې نظرونه نه منعکس کوي.

د نورو معلوماتو او ملاتړ لپاره خپل نږدې د مهاجرو روغتیایي مرکز ته ورشئ.

مناسب ځای، ښه خدمت

f @ t v sihhhatproject

www.sihhatproject.org

sihhhat



This project is funded by the European Union. Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. هذا المشروع تم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي.

دونه ماشومان چې تاسو پاملرنه ورته کولای شې.



sihhhat



دا د میرمن لپاره یو له خورا اساسي بشري حقونو څخه دی چې په ازاده توګه پریکړه وکړي چې کله، په کوم وقفه کې، او څومره ماشومان وزیږوي.

د زیږون څخه شاوخوا یوه میاشت وروسته، ښځه د تناسلي مجرو تولید پیل کوي. نو، د امیندواری د مخنیوي طریقه لږترلږه باید د زیږون وروسته په یوه میاشت کې وکارول شي او له سقط څخه وروسته نږدې یوه اونۍ وروسته پیل کړل شي.

هغه شرایط چې د مور او ماشوم ژوند په خطر کې اچوي.

د 2 کلونو څخه د لنډ مهال امیندواری
په صورت کې؛ په نوي زیږیدلي ماشوم او مور کې روغتیايي ستونزې رامنځ کېدی شي، ځکه چې د بدن ذخیره په بشپړه توګه نه وي ډکه شوې. د پاملرنې د اختلال له وجې په بل ماشوم کې کیدای شي؛ فزیکي روانی او ټولنیزې ستونزې واقع شي.

له 4 څخه ډیر امیندواری؛ په مور کې په یووالي کې مهمې ناروغۍ لکه د ادرا بې نظمۍ، د رحم سرطان، د زړه ناروغۍ رامنځته شي؛ دا کولی شي په ماشومانو کې د پاملرنې ستونزې، وده او پرمختیايي ځنډ رامنځته کړي.


د تناسلي سیستم نیمګړتیا، د هډوکي چوکاټ او روحاني پراختیا له امله د **18 کلنۍ څخه** مخکې د انجونو امیندواری او زیږون ممکن د مور او ماشوم ژوند له خطر سره مخامخ کړي.

د 35 کلنۍ وروسته زیږون؛ په ماشوم کې روانې ستونزې او په مور کې کولی شي د جدي ناروغیو لکه د وینې لوړ فشار او شکر لامل شي.



د امیندواری د مخنیوي میتودونه

د نه کارولو په صورت کې سمدستي د امیندواری کیدلو طریقي



کنډوم (هوډ، پوښ) په سمه توګه کارولو په صورت کې ډیر اغیزمن دی. همدارنګه د جنسي اړیکو له لارې د انتقالیدونکي انتاناتو او ناروغیو لکه هج آی وی/ آیډز، ګونوریا، سیفیلس، هیپاتیت بی (زیري) څخه مخنيوي کوي.



ګولۍ باید هره ورځ وکارول شي. ګولۍ د زیږون کنترول سربیره نورې ګټې هم لري: د انیمیا مخه نیسي، د میاشتي درد کموي، او د رحم د سرطان د پراختیا خطر کموي.



د انټروټرین وسیله یو کوچنی، پلاستيکي وسیله ده چې د په رحم کې کینډول کېږي. که لرې نه شي، دا د 10 کلونو لپاره د امیندواری مخه نیسي، ددې اله په لرې کولو سره برته سم دستي د امیندواری کیدونکي ده.



ستنې یا پیچکاری د ښځینه تخمدان څخه د تناسلي حجرو رحم ته د داخليدو مخه نیسي چې په نتیجه کې د امیندواری مخنیوي کېږي.

د نه امیندواری ابدی میتودونه

د نارینه د تخم د کانال تړل (واسیکټومي)

د نارینه تخم د کانال تړل چې په یو ډیر کوچني جراحي پروسیجر سره تر سره کېږي، خو دا میتود سمدلاسه تاسي نه ژغوري. دا اړینه ده چې لږترلږه د دوو میاشتو لپاره جنسي اړیکه ونشي یا هم بله طریقه وکارول شي.

د ښځو د تخمدان کانال تړل (ټیوبل لیګیشن)

د میرمنو د تخمدان په یو جراحي تړل کېږي او په دې توګه، د نارینه او ښځینه تخمۍ (هګۍ او سپرم) نشي کولای یو ځای شي او امیندواری نه رامنځته کېږي. دا طریقه سمدستي تاسو له امیندواری ژغوري.