

اگر آپ کو علاج شروع کرنے کے بعد شفا یابی کی علامات نظر آئیں تو اپنی دوا پینا بند نہ کریں۔

اپنا علاج مکمل کریں!



اگر آپ کو دو ہفتے سے زیادہ کھانسی، تھوک کی پیداوار، بخار، رات کو پسینہ آنا، وزن میں کمی، بھوک نہ لگنا اور کمزوری جیسی شکایات ہیں تو قریبی صحت کے ادارے سے درخواست کریں!

یہ اشاعت یورپی یونین کے مالی تعاون سے تیار کی گئی ہے۔ اس کے مشمولات صرف جمہوریہ ترکی کی وزارت صحت کی ذمہ داری ہیں اور وہ یورپی یونین کے خیالات کی عکاسی نہیں کرتی۔

مزید معلومات اور قریبی تعاون کے لیے امیگرٹ ہیلتھ سنٹر میں آئیں۔

صحیح جگہ سے اچھی سروس


f @ t v sihatproject

www.sihatproject.org

sihat



This project is funded by the European Union.
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
هذا المشروع تم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي




ہمارا مقصد
ٹی بی-لیس
ایک ترکی

sihat



ہمارے ملک میں ٹی بی کی بیماری کا علاج مفت ہے!



تپ دق ایک متعدی بیماری ہے۔
تپ دق ایک قابل علاج بیماری ہے۔
تپ دق کا علاج کم از کم 6 ماہ
ہے۔ علاج کے خلاف مزاحم تپ دق
(18-24 ماہ) میں یہ مدت طویل
ہوتی ہے۔

زیادہ تر مریضوں میں، علاج
شروع ہونے کے 2-3 ہفتوں بعد
متعدی بیماری غائب ہو جاتی ہے۔

باقاعدہ دوائیوں سے
آپ تپ دق کا مکمل
علاج کر سکتے ہیں اور
اس طرح اسے اپنے آس
پاس کے لوگوں کو
متاثر ہونے سے روک
سکتے ہیں۔



براہ راست مشاہدہ شدہ علاج (DGT)؛

تپ دق کا مریض پورے
علاج کے دوران اپنی
دوائیوں کی ہر خوراک
پیتا ہے، اس کے ساتھ
عملے کا کوئی رکن یا
سپروائزر ہوتا ہے۔

مؤثر اور کامیاب
علاج کے لیے براہ راست
مشاہدہ شدہ علاج
ضروری ہے۔

جب آپ علاج شروع کرنے کے بعد بہتری کے آثار
دیکھیں تو اپنی دوائی لینا بند نہ کریں، اپنا
علاج مکمل کریں۔

دوا کا بے قاعدہ استعمال آپ کے علاج کو
پیچیدہ بناتا ہے، متعدی بیماری جاری رہتی ہے۔
منشیات کا بے قاعدہ استعمال مزاحم تپ دق کا
باعث بنتا ہے۔

مزاحم تپ دق طویل اور زیادہ منشیات کے
استعمال کی ضرورت ہے

اگر آپ کو اپنی دوائی استعمال کرنے کے
دوران غیر متوقع اثر کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو
جلد از جلد اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔

