


This project is funded by the European Union.
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
هذا المشروع تم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي



یہی فالو اپ کے اوقات اور وقفے

پیدائش پر؛

این ٹی پی کے لیے خون نکالا جانا چاہیے، ہیپاٹائٹس بی ویکسین کی پہلی خوراک دی جانی چاہیے، اورسننے کی سماعت کی اسکریننگ کی جانی چاہیے۔

1. فالو اپ

پہلا ہفتہ (1-10 دن کے درمیان)؛

اوپر سوال کریں، کمی پوری کریں، وٹامن ڈی کے 3 قطرے روزانہ 1 سال کی عمر تک استعمال کرنا شروع کریں۔

2. فالو اپ

دن 15 (11-29 دنوں کے درمیان)؛

اوپر سوال کریں، کمی پوری کریں، وٹامن ڈی کے 3 قطرے روزانہ استعمال جاری رکھیں۔

3. فالو اپ

دن 41 (30-59 دنوں کے درمیان)؛

ڈی ڈی ایچ کی جانچ پڑتال کریں (خاص طور پر اگر یہ بچی ہے، اگر ڈی ڈی ایچ کی خاندانی تاریخ ہے، اگر بریج پریزنٹیشن کی تاریخ ہے)۔

4. فالو اپ

دوسرا مہینہ (60-80 دنوں کے درمیان)؛

اگر یہ وقت سے پہلے یا کم وزن والا بچہ ہے تو، روزانہ آئرن کے 4 قطرے پروفیلیکٹک طور پر شروع کریں۔

5. فالو اپ

تیسرا مہینہ (90-115 دن)؛

ڈی ڈی ایچ، سماعت کی کیفیت، وٹامن ڈی کے استعمال اور دودھ پلانے کی کیفیت کے بارے میں دریافت کریں، اور کمی کو دور کریں۔

6. فالو اپ

چوتھا مہینہ (120-150 دن)؛

اگر خون کی کمی موجود ہے تو، مناسب خوراک شروع کریں، بصورت دیگر احتیاطی طور پر فی دن آئرن کے 4 قطرے (کم از کم 4 ماہ) شروع کریں۔

7. فالو اپ

چھٹا مہینہ (180-210 دنوں کے درمیان)؛

سماعت کی کیفیت، وٹامن ڈی کے استعمال اور دودھ پلانے کی کیفیت کے بارے میں دریافت کریں، اور کمی کو دور کریں۔

8. فالو اپ

نواں مہینہ (250 سے 290 دنوں کے درمیان)

HGB دیکھیں اور اگر ضرورت ہو تو آئرن کو شیڈول کریں۔ وٹامن ڈی کا استعمال جاری رکھیں۔

9. فالو اپ

مزید معلومات اور مدد کے لیے اپنے قریبی امیگرنٹ ہیلتھ سنٹر پر آئی!

صحیح جگہ سے، اچھی سروس